

**МОЗ УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ  
КАФЕДРА ХІРУРГІЇ №3**



## **«ХІРУРГІЧНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОУСКЛАДНЕНИХ ДУОДЕНАЛЬНИХ ВИРАЗОК»**

**Автори:**

Іванчов П.В., Біляченко М.В., Курбанов А.К., Пруднікова О.Б., Шкарбан В.П., Біляков-Бельський О.Б., Козлов С.М., Лісов О.І., Лобода С.С., Кошман І.С.

# ВСТУП

- Незважаючи на широке впровадження нових схем противиразкової та антихелікобактерної терапії на сьогодні актуальною проблемою залишається хірургічне лікування гостроускладнених дуоденальних виразок, що пов'язано як зі збільшенням кількості ускладнень, так і з різними поглядами на вибір хірургічної тактики їх лікування.
- Проте, незважаючи на загальносвітову тенденцію незначного зниження захворюваності на виразкову хворобу загалом та виразку дванадцятипалої кишки зокрема, залишається доволі велика кількість пацієнтів із поєднаними ускладненнями що загрожують життю.

# МЕТА

Проаналізувати лікувальні підходи, тактику та покращити результати лікування гостроускладнених дуоденальних виразок.

# МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Представлені результати виконаного аналізу хірургічного лікування гостроускладнених дуоденальних виразок (комбінація 3 та 4 поєднаних ускладнень) за **2 періоди**: 1-й (2000 - 2014) роки (група А) - 47 хворих, 2-й (2015 - 2021) роки (група В) - 34 хворих.



# РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

- З приводу гостроускладнених дуоденальних виразок було прооперовано **81 (100%)** пацієнт, з них у **68 (84,3%)** пацієнтів було поєднання трьох ускладнень, а у **13 (15,7%)** – чотирьох ускладнень. Із **81** пацієнта в **72** було відзначено ускладнення кровотечею, що становить **89,3%**. Ускладнення перфорацією виразки – у **36** пацієнтів, що становить **44,7%** від усіх інших ускладнень.
- Виходячи з отриманих даних аналізу, спостерігається стійка тенденція до збільшення частки органощадних операцій в **1,6 рази** (з **50,9%** до **81,4%**), зменшення кількості резекцій шлунку у **2,9 рази** (з **14,9%** до **4,9%**) та паліативних операцій у **3,2 рази** (з **15,8%** до **4,9%**) при відносно стабільній кількості виконаних органозберігаючих операцій: у групі А – **17 (24,6%)** втручань, у групі В - **4 (21,1%)**.

# ВИСНОВКИ

- Кількість хворих, яким було проведено невідкладну операцію з перфорацією виразки та кровотечею, як поєднаними ускладненнями, зменшилась у другому періоді порівняно з першим у **2,5 рази**, що пов'язано з широким застосуванням **сучасних інгібіторів протонної помпи** у консервативному лікуванні дуоденальних виразок.
- Кількість ускладнень та смертність даної когорти пацієнтів суттєво зменшилась за рахунок застосування **методів ендоскопічного гемостазу**, які дали змогу стабілізувати та готувати хворих прямо на операційному столі.